



A MURRAY GREY FAJTA MAGYARORSZÁGON

**Husmarhatenyésztési Tanácskozás
Keszthely, 2016. november 03.**

RÖVID VISSZAPILLANTÁS AZ ELMULT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRE

2015 szeptember	az Egyesület megalakulása (elnök: Horn Péter ügyvezető: Mihalecz András)
	53 nőivaru állat, 50 embrió, továbbá 3 növendékbika importja Nagy Britanniából ill. Kanadából
2016 szeptember	megjelenés a KÁN tenyészállat-bemutatóján
2016 október	MÁSZ ill. MSZSZ tagság
Taggazdaságok száma	10
Tagok száma	28 (pártoló tagokkal együtt)
Populációméret	100 nőivaru állat + 3 tenyészbika ebből 2 MT állomáson STV-be beállított bikák száma 20

A FAJTA KIALAKULÁSA ÉS HELYE A VILÁGBAN

1905

ABERDEEN ANGUS



SHORTHORN




















A MURRAY GREY FAJTA FŐBB JELLEMZŐI

- Közepes testtömeg (tehén 550-600 kg)
- *Ezüst színű*
- Genetikailag szarvtalan
- Kiváló anyai tulajdonságok (koraérő, könnyen ellő)
- Növekedési erélyközepes
- Husformák jók
- Vágóértékét és husminőségét az „angus” kategóriába sorolják a minősítők



MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK

NÖVEKEDÉS A NYÁRI IDŐSZAKBAN

Genotípus	Születési súly kg	Időszaki súly (aug.29) kg	Napi sg. g
Fekete angus	27,0	156,9	876
Vörös angus	27,5	158,2	992
Murray Grey	28,1	138,4	1030

KÜLÖNBÖZŐ SZINÜ HUSMARHÁK HŐTÜRŐKÉPESSÉGE

Fajta	Léghőmérséklet/ páratartalom	Bőrfelszín hőmérséklete C	Testhőmérséklet C
Fekete angus (n=32)	34,4 C 45%	48,21	39,34
Vörös angus (n=27)	34,4 C 45%	44,38	39,20
Murray Grey (n=30)	34,4 C 45%	38,28	39,34

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

- A bőrfelszín hőmérséklete szoros kapcsolatban van a bőr színével. A fekete színű állatok testfelülete az intenzív napsugárzás hatására erősebben felmelegedik mint az ezüstszürke színeké. A vörös színű állatok reakciója a két szélső érték között volt.
- A testfelszín és a belső testhőmérséklet különbsége a hősokk mértékét jelzi. Fekete bőrszín esetén ez a különbség elérheti a 10 C fokot is. Néhány esetben a borjak kezelésére is szükség volt.
- A szürke színű állatoknál azonos hő terhelés mellett alig volt különbség a testfelszín és a belső hőmérséklet között

A Murray Grey fajta esélyei

- A közepes-gyenge legelőkön kevés nyári takarmánykiegészítéssel is tartható
- Jól bírja a nyári hőséget
- Kiváló borjúnevelő
- Minőségi hízóalapanyagot szolgáltat
- Nyugodt, szelíd természet, könnyen kezelhető

Kipróbálni, tudományos igényvel tapasztalatokat gyűjteni!

09-UK 305513200721Crenut



08-UK 300513300722 Crether



www.murraygrey.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!